



**Universitätsklinik für Innere Medizin II,
Abteilung Kardiologie**

**Ambulanz für angeborene Herzfehler
im Erwachsenenalter**

Priv.-Doz.in Dr.in Lore Schrutka, PhD

Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien

T: +43 (0)1 40400-62800

EMAH@meduniwien.ac.at

Interventioneller Verschluss von PFO und ASD

Um eine optimale Vorbereitung zu gewährleisten, bitten wir um die folgenden **Unterlagen** und **Zusendung der bewegten Bilder der Herzultraschall Untersuchung** (Übertragung über PACS System oder postalisch per CD-Zusendung).

Persistierendes Foramen ovale (PFO)

- ☐ **Indikation:**
 - **Thromboembolisches / neurologisches Ereignis:** Neurologische Stellungnahme die den PFO-Verschluss als indiziert erachtet (u.a. nach kryptogenem Schlaganfall)
 - **Dekompressionskrankheit:** Tauchärztliche Stellungnahme
- ☐ **Langzeit-EKG (mindestens 24 Stunden)**
- ☐ **Carotis-Duplex-Sonographie**
- ☐ **Gerinnungsstatus:**
 - Basisdiagnostik: INR, aPTT, Thrombozyten, Fibrinogen
 - <60 Jahre: Ausschluss von Vaskulitis, Lupus erythematodes und Antiphospholipid-Syndrom (Lupusantikoagulans, Anti-Cardiolipin-IgG/IgM, Anti-β2-Gykloprotein-I-IgG/IgM, ANA, Anti-dsDNA, ANCA (PR3/MPO), Komplement C3/C4, ENA-subsets)
- ☐ **Transösophageale Echokardiographie (TEE): inkl. Kontrastmittelgabe**

Vorhofseptumdefekt (ASD)

- ☐ **Indikation:** Fachärztliche Zuweisung (Kardiologie)
- ☐ **Langzeit-EKG (mindestens 24 Stunden)**
- ☐ **Transthorakale Echokardiographie (TTE)**
- ☐ **Transösophageale Echokardiographie (TEE) (falls vorhanden)**
- ☐ **CT-Thorax (falls vorhanden):** Ausschluss einer Lungenvenenfehlmündung
- ☐ **MRT des Herzens (falls vorhanden):** Rechtsventrikuläre Volumen- und Funktionsbestimmung, inkl. Shuntberechnung (Qp:Qs), Ausschluss einer Lungenvenenfehlmündung

Weiteres Vorgehen und Terminvereinbarung

Nach Eingang der vollständigen Unterlagen nehmen wir eine strukturierte Fallbesprechung vor und informieren Sie zeitnah über das weitere Vorgehen.

Mit freundlichen Grüßen,

Priv. Doz.in Dr.in Lore Schrutka, PhD